

тип препарата	вредный объект, спектр действия	До распускания почек	Распускание почек, 3-5 листьев	Обособление соцветий	Цветение	Ягода с горошину	Смыкание грозди	Начало созревания	После уборки	
	Стадия развития (код ВВСН)	00-09	11-15	53-57	60-69	71-75	77-79	81-85	91-97	
ФУНГИЦИДЫ	Милдью		МЕЦЕНАТ, СП (манкоцеб, 800 г/кг)							
	Милдью, антракноз		ФАМОКС, ВДГ (фамоксадон, 250 г/кг + цимоксанил, 250 г/кг)							
	Милдью, серая гниль				ФЛО-ТИ-ФЛУ, КЭ (флуазинам, 200 г/л + мефеноксам, 120 г/л)					
	Оидиум				ДИСКОР, КЭ (дифеноконазол, 250 г/л)					
	Оидиум, чёрная пятнистость				ФЛУПЛАНТ, КС (флутриафол, 250 г/л)					
ИНСЕКТИЦИДЫ	Клещи, цикадки, трипсы		ЕВРОДИМ, КЭ (диметоат, 400 г/л)							
	Гроздевая листовёртка, цикадки				ИМИПРИД ДУО, КС (имидаклоприд, 300 г/л + лямбда-цигалотрин, 100 г/л)					
	Гроздевая и двулетняя листовёртки				ПАМПЕРО, КС (хлорантранилипрол, 200 г/л)					
РЕГУЛЯТОРЫ РОСТА	Повышение устойчивости к стрессам				АГРОСТИМУЛ, ВЭ (дигидрокверцетин, 50 г/л)					
АДЪЮВАНТЫ	Снижение сноса рабочего раствора		ДРИФТАКВА, КЭ (пинолен, 90-96 %)							
	Прилипатель, удержание раствора		КИКЕРАКВА, КЭ (пинолен, 90-96 %)							
	Повышение эффективности обработок		МЕТИС, МКЭ (вазелиновое масло, 658 г/л)							
БИОПРЕПАРАТЫ	Деструкция растительных остатков									КАПАНЕЯ, Ж (Bacillus subtilis, Trichoderma viride)
МИКРОУДОБРЕНИЯ	Некорневые подкормки, макро- и микроэлементы		АГРОСТИМУЛ «БОР»; АГРОСТИМУЛ «ЦИНК»; АГРОСТИМУЛ МАКС БОР 150							
	Некорневые подкормки, микроэлементы		АГРОСТИМУЛ МАКС КАЛЬЦИЙ ФОРТЕ; МАГНИЙ 500; МАРГАНЕЦ 500; МЕДЬ 228; СЕРА 900; ЦИНК 700							